

# Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Coleoptera) aus Norddeutschland

Klaus Renner

Abstract: New findings and rediscoveries of beetle species (Coleoptera) from Northern Germany. – A comparison of the findings of the author and the online catalogue „Entomofauna Germanica“ revealed numerous new findings and rediscoveries of Coleoptera in Northern Germany.

## 1. Einleitung

Das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) mit seinen Nachträgen (KÖHLER 2000, 2011) gilt als Standardwerk für das nachgewiesene Vorkommen von Käferarten in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Seit Ende 2012 ist es auch online als Internet-Katalog „Entomofauna Germanica“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 2013) verfügbar und wird laufend durch Literatur-Recherchen und Materialrevisionen aktualisiert.

Der Verfasser hat seit mehreren Jahrzehnten in vielen Regionen Deutschlands entomologische Untersuchungen zur Käferfauna durchgeführt und faunistische Besonderheiten publiziert (z. B. RENNER 1969, RENNER 2007, RENNER et al. 1986, ROSE et al. 2006, 2007). Ziel der vorliegenden Arbeit war die Überprüfung, inwieweit sich darunter bisher nicht mit aktuellem Status in der „Entomofauna Germanica“ dokumentierte Vorkommen von Käferarten in Norddeutschland befinden.

## 2. Methodik

Sämtliche Funde des Autors wurden mit den Einträgen in „Entomofauna Germanica“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 2013) abgeglichen und der Status (Neufund, Wiederfund nach > 50 oder > 100 Jahren) ermittelt. Da zahlreiche Koleopterologen ihre Käferfunde in „Entomofauna Germanica“ selbst hochladen können, werden solche Funde, die im Verzeichnis der Käfer Deutschlands den bisherigen Status in einer Region verändern, an eine Publikation in Druckfassung gekoppelt.

## 3. Ergebnisse

Das Abgleichen der Funde des Autors mit dem Katalog „Entomofauna Germanica“ hat für die norddeutschen Faunengebiete etliche ältere Funde aufgezeigt, die als Neu- oder Wiederfund zu werten sind (Tab. 1).

## 4. Diskussion

Bisher war es äußerst aufwendig, oft sogar unmöglich, sämtliche Veröffentlichungen – und zwar nicht nur die in den gängigen Fachzeitschriften – zu finden und einzusehen, um einen Käferfund richtig bewerten zu können. Dies gelingt nun durch die laufend aktualisierte Online-Version der „Entomofauna Germanica“ viel leichter und schneller. Auch die große Anzahl unveröffentlichter Funde in vielen Sammlungen, einschließlich der in Museen, kann nun gezielt ausgewertet werden, wie oben die lange Liste der Neufunde aus der Region Hannover zeigt.

Tab. 1: Neu- und Wiederfunde des Verfassers von Käferarten für Norddeutschland  
Code = Identifizierungscode nach Lucht (siehe KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), \* = Erstfunde für die jeweilige Region (nach KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)

Code	Art und Fundstatus	Fundort	Jahr
<b>Region Hannover</b>			
01-.029-.014.-	* <i>Bembidion bipunctatum</i> (Linné, 1761), (Carabidae)	Oberharz, Altenau, 800 m	1988
01-.062-.007.-	<i>Agonum gracilipes</i> (Duftschmid, 1812), (Carabidae), bisher nur eine als fraglich eingestufte Meldung von GERSDORF & KUNTZE 1957	Göttingen, Rosdorf	1971
18-.002-.001.-	* <i>Eutheia plicata</i> (Gyllenhal, 1813), (Staphylinidae, Scydmaeninae)	Uslar, Delliehausen	1974
23-.032-.013.-	<i>Lesteva pubescens</i> Mannerheim, 1830, (Staphylinidae), Wiederfund nach > 50 Jahren	Oberharz, Bruchberg	1973
23-.032-.013.-	<i>Lesteva pubescens</i> Mannerheim, 1830, (Staphylinidae)	Oberharz, Oder-Stausee	1977
23-.188-.150.-	* <i>Atheta subsinuata</i> (Erichson, 1839), (Staphylinidae)	Oberharz, Oder-Stausee	1977
23-.188-.180.-	* <i>Atheta fimorum</i> (Brisout, 1860), (Staphylinidae)	Göttingen, Rosdorf	1969
23-.188-.213.-	* <i>Atheta putrida</i> (Kraatz, 1856), (Staphylinidae)	Oberharz, Bad Grund	1988
23-.188-.220.-	* <i>Atheta parapicipennis</i> Brundin, 1954, (Staphylinidae)	Oberharz, Bruchberg	1973
27-.009-.021.-	* <i>Malthodes hexacanthus</i> Kiesenwetter, 1852, (Cantharidae)	Oberharz, Oder-Stausee	1974
34-.007-.001.-	<i>Elater ferrugineus</i> Linné, 1758, (Elateridae), bisher nur Alt funde vor 1900 (SCHMIDT et al. 2005)	Göttingen, Rosdorf	1973
37-.001-.0033.-	* <i>Trixagus meybohmi</i> Leseigneur, 2005, (Throscidae)	Göttingen, Dransfeld	1972
38-.015-.010.-	* <i>Anthaxia candens</i> (Panzer, 1789), (Buprestidae)	Göttingen, Hermannrode	1972
40-.003-.005.-	* <i>Cyphon kongsbergensis</i> Munster, 1924, (Scirtidae), det. Lohse 1974	Oberharz, Bruchberg	1970
40-.003-.010.-	* <i>Cyphon punctipennis</i> Sharp, 1873, (Scirtidae)	Oberharz, Bruchberg	1970
55-.008-.033.-	* <i>Cryptophagus corticinus</i> Thomson, 1863, (Cryptophagidae)	Celle, Homshof	1977
58-.003-.0011.-	* <i>Lathridius porcatus</i> (Mannerheim, 1844), (Lathridiidae)	Oberharz, Oder-Stausee	1977
68-.007-.007.-	<i>Ernobius angusticollis</i> (Ratzeburg, 1847), (Anobiidae), Wiederfund nach > 50 Jahren	Göttingen, Rosdorf	1972
68-.012-.008.-	<i>Anobium rufipes</i> Fabricius, 1792, (Anobiidae), Wiederfund nach > 50 Jahren (SCHMIDT et al. 2005)	Göttingen, Rosdorf	1973
69-.008-.008.-	<i>Ptinus clavipes</i> Panzer, 1806, (Ptinidae), Wiederfund nach > 100 Jahren	Göttingen, Rosdorf	1969
70-.010-.001.-	* <i>Oedemera flavipes</i> (Fabricius, 1792), (Oedemeridae)	Göttingen, Hermannrode	1972
79-.003-.007.-	* <i>Mordella brachyura</i> Mulsant, 1856, (Mordellidae)	Göttingen, Varmissen	1973
79-.011-.059.-	<i>Mordellistena acuticollis</i> Schilsky, 1895, (Mordellidae)	Karlshafen, Oedelsheim	1973
79-.011-.059.-	* <i>Mordellistena acuticollis</i> Schilsky, 1895, (Mordellidae)	Göttingen, Rosdorf	1973
83-.026-.002.-	* <i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781), (Tenebrionidae)	Göttingen, Rosdorf	1969
83-.026-.002.-	<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781), (Tenebrionidae)	Göttingen, Rosdorf	1970
91-.008-.001.-	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann, 1794), (Scolytidae), Wiederfund nach > 50 Jahren	Oberharz, Altenau, 800 m	1988
93-.121-.001.-	* <i>Adexius scrobipennis</i> Gyllenhal, 1834, (Curculionidae)	Göttingen, Niedernjessa	1974
<b>Region Niederelbe</b>			
23-.046-.020.-	* <i>Carpelimus ganglbaueri</i> (Bernhauer, 1901) (Staphylinidae), test. Schülke	Schreyahn, Salzstelle	1983
23-.050-.026.-	<i>Bledius occidentalis</i> Bondroit, 1907 (Staphylinidae), test. Schülke, Wiederfund nach > 50 Jahren, ältere Funde notiert von ZIEGLER (1997)	Schreyahn, Salzstelle	1983
561.002-.001.-	* <i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787), (Laemophloeidae)	Cuxhaven, Lamstedt	1992
79-.011-.035.-	* <i>Mordellistena luteipalpis</i> Schilsky, 1895 (Mordellidae), det. Meybohm	Hitzacker, Wusseger	1974
87-.038-.001.-	* <i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839), (Cerambycidae)	Lüneburg, Apotheke	1958
88-.051-.001.-	* <i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudras, 1860), (Chrysomelidae)	Cuxhaven, Hemmoor	2011
89-.006-.001.-	* <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831), (Bruchidae)	Uelzen, Apotheke	1954
<b>Region Schleswig-Holstein</b>			
45-.002-.0011.-	* <i>Attagenus smimovi</i> Zhan'tiev, 1973, (Dermestidae)	Lübeck, Stadtgebiet	2012

## Zusammenfassung

Ein Abgleich der Funde des Verfassers mit dem online-Katalog „Entomofauna Germanica“ brachte zahlreiche Neu- und Wiederfunde von Coleoptera in Norddeutschland zum Vorschein.

## Danksagung

Für die automatisierten Abgleich-Arbeiten gilt mein besonderer Dank F. Köhler (Bornheim), H. Meybohm (Grosshansdorf) und M. Schülke (Berlin) gilt mein Dank für Bestimmungshilfen.

- GERSDORF, E. & K. KUNTZE (1957): Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens. – Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover **103**: 101–136.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte **44**: 60–84.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (Köhler & Klausnitzer 1998) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **55**: 109–174, 247–254.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1–185.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (2013): Entomofauna Germanica. – <http://www.coleokat.de/de/fhl/> [30.4.2013]
- RENNER, K. (1969): *Meligethes wankai* Reitter (Col., Nitidulidae): Neufund für Deutschland. – Entomologische Blätter **65**: 65–66.
- RENNER, K. (2007): *Ephistemus reitteri* Casey, 1900, und *Acrotona pseudotenera* (Cameron, 1933) aus Brünkendorf im Kreis Lüchow-Dannenberg (Col., Cryptophagidae, Staphylinidae). – Bombus **3**: 298–299.
- RENNER, K., B. GRUNDMANN & R. BORCHERING (1986): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna (IV). – Entomologische Blätter **82**: 44–54.
- ROSE, A., A. BELLMANN, B. BÜCHE, J. ESSER, C. MAUS & K. RENNER (2006): Kurzflügelkäfer der ostfriesischen Inseln: unpublizierte Funde, Funddaten sowie Korrekturen (Coleoptera, Staphylinidae: excl. Aleocharinae) – 1. Teil. – Drosera **2006**: 129–156.
- ROSE, A., A. BELLMANN, B. BÜCHE, J. ESSER, C. MAUS & K. RENNER (2007): Kurzflügelkäfer der ostfriesischen Inseln: unpublizierte Funde, Funddaten sowie Korrekturen (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) – 2. Teil. – Drosera **2007**: 137–156. Oldenburg.
- SCHMIDT, L., P. SPRICK, H.-H. HAHLBOHM, N. MENKE (2005): 4. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, ehemals Region Hannover (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Westfälischer Entomologen **21**: 1–24.
- ZIEGLER, W. (1997): Vierter Nachtrag zur Käferfauna von Schleswig-Holstein und dem Niederelbegebiet. – Bombus **3**: 92–102.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Klaus Renner  
Wickenkamp 9a  
33615 Bielefeld